

# CarboGel



330g / 300 ml

Aanvullend diervoeder - Complementary feed - Ergänzungsfuttermittel - Aliment complémentaire

## NL Ter ondersteuning bij het dikker maken van de mest.

**Samenstelling** Water (63%), natuurlijk houtskool van eikenhout (32%), kaliumchloride en natriumchloride (1%). **Additieven** Aromatische en eetlustopwekkende stoffen (0,04%).

**Analytische bestanddelen** Ruwe celstof (21%), as (2,5%), eiwitten (0%), vetten (0%), lysine (0%), methionine (0%), natrium (0,9%). **Gebruiksaanwijzing en dosering** 's Ochtends en 's avonds toedienen voor 2 à 3 dagen. 1) Plaats de tube in het speciale handpistool, 2) De kop van het dier vastpakken en iets omhoog houden, 3) De opening van de tube achter in de bek, op het midden van de tong plaatsen. Toedienen met een geschikte applicator. (1x knijpen = 15ml). Kalveren: 2 x knijpen; Schapen/Geiten: 2 x knijpen; Lammeren: 0,5 x knijpen; Gespeende biggen: 0,5 x knijpen; Biggen ± 25 kg: 1 x knijpen. Niet toedienen aan zieke of verzwakte dieren. Stop met het toedienen van het product in het geval van verslikken. **Bewaaraadvies** Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren.

Beschermen tegen vorst. **Ten minste houdbaar tot / Batchnr.** zie verpakking. GMP+FSA geborgd - GMO controlled - PDV103322 - **Erkenningsnummer producent** αFR01033003

## EN To support the thickening of the manure.

**Composition** Water (63%), oak charcoal (32%), potassium chloride and sodium chloride (1%). **Additives** Mixture of flavouring compounds (0.04%). **Analytical constituents** Crude fiber (21%), crude ash (2.5%), crude protein (0%), crude fats & oils (0%), lysine (0%), methionine (0%), sodium (0.9%). **Instructions for use and dosage** Administer in the morning and evening for 2 or 3 days. 1) Slightly lift the animal's head, 2) Enter the cartridge into the mouth to the center of the tongue, 3) Pump. Administer with a suitable applicator. (1 stroke: 15 mL). Calves: 2 strokes; Sheep/Goats: 2 strokes; Lambs 0,5 stroke; Weaners:

0.5 stroke; Pigs ± 25 kg: 1 stroke. Do not feed to sick immobile animals. Interrupt feeding if the animal shows a false swallowing reflex. **Storage instructions** Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost. **Best before / Batch No.** see packaging. GMP+FSA assured - GMO controlled - PDV103322 - **Approval number producer** αFR01033003

## DE Zur Unterstützung der Verdickung des Mistes.

**Zusammensetzung** Wasser (63%), Eichenholzkohle (32%), Kaliumchlorid und Natriumchlorid (1%). **Zusatzstoffe** Mischung von Aromastoffen (0,04%). **Analytische Bestandteile** Rohfaser (21%), Asche (2,5%), Proteine (0%), Fett (0%), Lysin (0%), Methionin (0%), Natrium (0,9%). **Gebrauchsanweisung und Fütterung** Morgens und abends 2 bis 3 Tage lang verabreichen. 1) Kopf des Tieres anheben, 2) Kartuschenöffnung in den Mund stecken, bis zur Zungenmitte, 3) Pumpen.

Verfütterung mit einem geeigneten Applikator. (1 Pumpenstoss = 15ml). Kälber: 2 Stöße; Schafe/Ziegen: 2 Stöße; Lämmer: 0,5 Stoss; Absetzferkel: 0,5 Stoss; Ferkel ± 25 kg: 1 Stoss. Nicht an kranken immobilen Tieren verabreichen. Anwendung abbrechen, wenn sich das Tier verschluckt. **Lagerungshinweise** Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen. **Mindestens haltbar bis / Batch-Nr.** siehe Verpackung. GMP+ FSA gesichert - GMO controlled - PDV103322 - **Zulassungs-Nr. Hersteller** αFR01033003

## FR Pour favoriser l'épaississement du fumier.

**Composition** Eau (63%), charbon naturel de chêne (32%), chlorure de potassium et chlorure de sodium (1%). **Additifs** Mélange des substances aromatiques (0,04%). **Constituants analytiques** cellulose brute (21%), cendres (2,5%), protéines (0%), graisses (0%), lysine (0%),

methionine (0%), sodium (0,9 %). **Mode d'emploi et dosage** Administer le matin et le soir pendant 2 ou 3 jours. 1) Prendre et étendre délicatement la tête de l'animal, 2) Mettre l'ouverture de la cartouche dans la bouche au centre de la langue, 3) Presser. Appliquer avec un lance adapté. (1 pression = 15 mL). Veaux: 2 pressions; Ovins/Caprins: 2 pressions; Agneaux: 0,5 pression; Porcs sevrages: 0,5 pression; Porcs ± 25 kg: 1 pression. Ne pas administrer aux animaux léthargiques. Arrêter l'administration du produit en cas de fausse déglutition. **Conditions de stockage** Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel. **Date limité de conservation / No de lot** voir emballage. Garanti GMP+ FSA - GMO controlled - PDV103322 - **No agrément du producteur** αFR01033003



*it's about details*



**Topro:** registered trademark of **Bio Enterprise B.V.**  
Sluiskolk 3, 7681 KC Vroomshoop NL  
info@topro.nl www.topro.nl

