

FARM-O-SAN

EN- Farm-O-San Kubilam Feed material for lambs

Composition: Colostrum. Analytical constituents and levels: Crude protein 50,0%, Crude fibre 0,0%, Crude oil and fats 2,0%, Crude ash 3,0%, Sodium 0,1%. Additional information: IgG 20,0%, IgA 1,5-3,0%, IgM 1,0-2,5%. Directions for use: Provide Farm-O-San Kubilam as a colostrum supplement or replacer in young lambs and goat kids directly after birth. Advised application: Use 1 x 40 gram Kubilam per 4 kg bodyweight as colostrum replacer. Dissolve 40 grams (2 sachets) in 150 ml water (\pm 40°C). Use 20 gram per 4 kg bodyweight as a supplement. Apply directly after birth, within 6 hours. When repeating treatment, ultimately supply Kubilam within 12 hours after birth. Storage conditions: Store in a cool, dark and dry place in sealed packaging. Notice: Farm-O-San Kubilam is tested free of Mycobacterium Paratuberculosis spp. and Rhesus disease.

NL- Farm-O-San Kubilam Voedermiddel voor lammeren

Samenstelling: Colostrum. Analytische bestanddelen en gehalten: Ruw eiwit 50,0%, Ruwe celstof 0,0%, Ruw vet 2,0%, Ruwe as 3,0%, Natrium 0,1%. Aanvullende informatie: IgG 20,0%, IgA 1,5-3,0%, IgM 1,0-2,5%. Gebruiksaanwijzing: verstrek Farm-O-San Kubilam als biestaanvulling of -vervanging aan jonge lammeren of geitenlammeren direct na de geboorte. Aanbevolen gebruik: gebruik 1x 40 gram Kubilam per 4 kg lichaamsgewicht als biestervanger. Los 40 gram (2 sachets) Kubilam op in 150 ml water (\pm 40°C). Gebruik 20 gram per 4 kg lichaamsgewicht als biestaanvulling. Gebruik zo snel mogelijk na geboorte, binnen 6 uur. Wanneer de behandeling herhaald wordt, Kubilam toedienen binnen de eerste 12 uur na de geboorte. Bewaarcondities: koel, donker en droog bewaren in gesloten verpakking. Extra informatie: Farm-O-San Kubilam is getest en vrij bevonden van Mycobacterium Paratuberculosis spp. en Rhesusziekte.

DE- Farm-O-San Kubilam Einzelfuttermittel für Lämmer

Zusammensetzung: Colostrum. Analytische Bestandteile und Gehalte: Rohprotein 50,0%, Rohfaser 0,0%, Rohöl und -fette 2,0%, Rohasche 3,0%, Natrium 0,1%. Weitere Informationen: IgG 20,0%, IgA 1,5-3,0%, IgM 1,0-2,5%. Gebrauchsanleitung: Verabreichen Sie Farm-O-San Kubilam direkt nach der Geburt als Ergänzung oder Ersatz des Kolostrums bei jungen Lämmern und Ziegenkitzen. Empfohlene Anwendung: 1 x 40 Gramm Kubilam je 4 Kilogramm Körpergewicht als Kolostrumersatz verwenden. 40 Gramm (2 Sachets) in 150 Milliliter Wasser (\pm 40°C) auflösen. 20 Gramm je 4 Kilogramm Körpergewicht als Ergänzung verwenden. Kubilam innerhalb von 6 Stunden nach der Geburt verabreichen. Bei wiederholter Behandlung innerhalb von 6 Stunden nach der ersten Gabe verabreichen. Lagerung: An einem kühlen, dunklen und trockenen Ort in der geschlossenen Verpackung lagern. Information: Farm-O-San Kubilam wurde vor kurzem untersucht und ist nachweislich frei von Mycobacterium Paratuberculosis spp. und der Rhesuskrankheit.

FR- Farm-O-San Kubilam Matière première pour aliment les agneaux

Composition: Colostrum. Constituants analytiques et teneurs: protéines brutes 50,0%, cellulose brutes 0,0%, matières grasses brutes 2,0%, cendres brutes 3,0%, sodium 0,1%. Informations additionnelles: IgG 20,0%, IgA 1,5-3,0%, IgM 1,0-2,5%. Mode d'emploi: Distribuez Farm-O-San Kubilam comme supplément ou substitut de colostrum chez les jeunes agneaux et chevreaux directement après la naissance. Administration: Utilisez 1 x 40

grammes Kubilam par 4 kg de masse corporelle comme remplacement de colostrum. A mélanger dans l'eau (\pm 40°C) à raison de 40 grammes (2 sachets) dans 150 ml d'eau. Utilisez 20 grammes par 4 kg de masse corporelle comme supplément. Utilisez aussi vite que possible après la naissance, en moins de 6 heures. Quand vous répétez le traitement, administrez Kubilam en moins de 12 heures après la naissance. Conditions de stockage: Conservez aux endroits frais, obscurs et secs dans l'emballage fermé. Remarque: Farm-O-San Kubilam est récemment examiné et testé libre de Mycobacterium Paratuberculosis spp. et la maladie de Rhesus.

ES- Farm-O-San Kubilam Materia prima para piensos de corderos

Composición: Calostro. Componentes y niveles analíticos: Proteína bruta 50,0%, Fibra bruta 0,0%, Aceites y grasas brutas 2,0%, Ceniza bruta 3,0%, Sodio 0,1%. Modo de empleo: Administrar Farm-O-San Kubilam como reemplazante o suplemento del calostro en corderos y cabritos directamente después de nacer. Consejo de utilización: Utilizar 40 gramos de Kubilam por 4 kg de peso corporal como reemplazante del calostro. Disolver 40 gramos (2 sobres) en 150 ml agua (\pm 40°C). Utilizar 20 gramos por 4 kg de peso corporal como un suplemento. Utilizar tan pronto como sea posible después del nacimiento, dentro de las 6 primeras horas. Cuando sea necesario repetir administración, suplementar Calostro dentro de las primeras 12 horas después del nacimiento. Condiciones de almacen: Almacenar en lugar fresco, oscuro y seco con envase cerrado. Nota: Farm-O-San Kubilam está testado libre de Mycobacterium Paratuberculosis spp y Enfermedad de Rhesus.

CZ- Farm-O-San Kubilam Krmná surovina pro jehňata

Složení: Mlézivo. Analytické složky a obsah: Hrubý protein 50,0%, Hrubá vláknina 0,0%, Hrubé oleje a tuky 2,0%, Hrubý popel 3,0%, Sodík 0,1%. Doplňková informace: IgG 20,0%, IgA 1,5-3,0%, IgM 1,0-2,5%. Krmný návod: Podávejte Farm-O-San Kubilam jako doplněk nebo náhradu kolostra jehňatům a kůzlátům ihned po narození. Doporučená podávání: Použijte 1 x 40 gramů Kubilam na 4 kg tělesné hmotnosti jako náhradu mléziva. Rozpusťte 40 g (2 sáčky) v 150 ml vody (\pm 40°C). Použijte 20 gramů na 4 kg tělesné hmotnosti jako doplněk mléziva. Podávejte bezprostředně po narození, nejdříve do 6 hodin po narození. Opakovanou dávku podávejte nejdříve do 12 hodin po narození! Skladování: Skladujte na chladném, suchém a tmavém místě v uzavřeném obalu. Poznámka: Farm-O-San Kubilam je vzorkovaný a testovaný na Mycobacterium Paratuberculosis spp. na Rh nemoci.

IT- Farm-O-San Kubilam Materia prima per agnelli

Composizione: Colostrum. Componenti analitici e relative tenori: Proteina grezza 50,0%, Cellulosa grezza 0,0%, Oli e grassi grezzi 2,0%, Ceneri grezze 3,0%, Sodio 0,1%. Ulteriori informazioni: IgG 20,0%, IgA 1,5-3,0%, IgM 1,0-2,5%. Istruzioni per l'uso: Fornire Farm-O-San Kubilam come supplemento o sostituto del colostro nei giovani capretti ed agnelli direttamente alla nascita. Consigli di applicazione: Usare 40 grammi di Kubilam per 4 kg di peso vivo come sostitutivo del colostro. Sciogliere 40 grammi (2 bustine) in 150 ml di acqua (\pm 40°C). Usare 20 grammi per 4 kg di peso vivo come integrazione. Usare in unica somministrazione, appena possibile alla nascita, entro le 6 ore. In caso di ripetizione della somministrazione, completare con una somministrazione di Kubilam entro le 12 ore dalla nascita. Condizioni di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto in confezione chiusa. Informazioni: Farm-O-San Kubilam è testato come esente da Mycobacterium Paratuberculosis spp. e della malattia di Rhesus.

Lot reference number / Best before:
Referentienummer van de partij/Ten minste houdbaar tot:
Kennnummer der Partie/ Mindestens haltbar bis:
Le numéro de référence du lot/ à utiliser avant:
El número de referencia del lote/Utilizar preferentemente antes del:
Referenční číslo šarže/ Spotřebujte do
Il numero di riferimento della partita/ Da consumarsi preferibilmente entro:



Marketed by: Trouw Nutrition- alphaNL08388
Nijverheidsweg 2, 3881 LA PUTTEN, The Netherlands
For local contact information see: www.farmosan.com

20 g
Net content/Netto
inhoud/ Nettomasse/
La quantité nette/
La cantidad neta/
čistá hmotnost/
Quantitativo netto: